

Jak rozpoznać czy moje dziecko bierze narkotyki?

Czasem bardzo późno dowiadujemy się, że ktoś z bliskich jest uzależniony, a gdy dowiadujemy się, że są to nasze dzieci, jest to jeszcze bardziej bolesne. Droga od pierwszego razu do uzależnienia niestety jest długa i cechują ją pewne oznaki. Aby w porę zareagować i nie dopuścić do zagrożenia poniżej przedstawiona tabela ukazuje charakterystyczne dla biorących zachowania. Nie ujęto w zestawieniu tzw. „dopalaczy” ponieważ z powodu nieokreślonego składu, trudno o jednoznaczną diagnozę, zażywanie może dawać podobne objawy do wszystkich innych narkotyków. Nie dopuśćmy do rozwoju uzależnienia !! W każdej sytuacji potrzebny jest kontakt z lekarzem i terapeutą.

NAZWA (GRUPA) NARKOTYKÓW	KONTAKT JEDNORAZOWY (objawy)	DŁUGOTRWALE BRANIE (objawy)
opium, morfina, heroina, naturalne i półsyntetyczne przetwory maku	euforia, niepokój ruchowy lub senność, osłabienie reakcji na światło, brak apetytu, zwężenie źrenic, obniżenie ciśnienia krwi	wyniszczenie organizmu, zaparcia, zaburzenia menstruacji, próchnica, zmiany zapalne skóry
rozpuszczalniki środki wziewne	niezborność ruchów, agresja, rozszerzenie źrenic, kichanie, kaszel, krwawienie z nosa, mdłości, wymioty, biegunki	wyniszczenie organizmu, przekrwienie spojówek, zaburzenia pamięci, niepokój, przygnębienie, zaburzenia snu, oczopląs, osłabienie mięśni
marihuana, haszysz przetwory konopi indyjskich	euforia połączona z wielomównością, przekrwienie gałek ocznych, nadwrażliwość zmysłów („razi mnie światło”), kaszel, zaburzenie koordynacji ruchowe	wychudzenie, zaburzenia snu, przewlekłe zapalenie krtani i oskrzeli, apatia, trudności z koncentracją, zmienność nastrojów
kokaina, crack, przetwory liści krzewu coca	euforia, pewność siebie, brak potrzeby snu, wzrost aktywności (także seksualnej), rozszerzenie źrenic, wytrzeszcz gałek ocznych, katar, ból gardła, pociąganie nosem	wyniszczenie organizmu, urojenia prześladowcze, omamy, wybuchy agresji, bezsenność, drgawki, przemienne brak i wzrost łaknienia, ponadto crack upośledza oddychanie, powoduje utratę wagi i ataki
amfetamina narkotyk syntetyczny	euforia, duży przypływ energii, brak potrzeby snu, brak apetytu, agresja, rozszerzenie źrenic	bezsenność, wychudzenie, zmiany nastroju, wielomówność, drżenie kończyn, wymioty, rozszerzenie źrenic, wysypka, halucynacje
LSD narkotyk syntetyczny	zaburzenie koordynacji ruchów, drżenie mięśni, rozszerzenie źrenic, mdłości, psychoza	omamy z napadami lęku, apatia, agresja lub depresja, zanik zainteresowań, bezsenność, wiotkość mięśni

extasy narkotyk syntetyczny	podniecenie, zwiększona energia, odporność na zmęczenie i sen, ból głowy	niepokój, depresja, paranoja, obniżenie sprawności intelektualnej, mania prześladowcza
-----------------------------	--	--

marihuana, haszysz	słodkawa woń oddechu, włosów i ubrania, brązowo-zielone liście i nasionka, nagle zainteresowanie hodowlą roślin przez Twoje dziecko, tiffki i fajki, bibułka papierosowa
opium, morfina, polska heroina, brown sugar	igły, strzykawki, ślady nakłuć po wstrzyknięciach, ślady krwi na odzieży, „gęsia skórka”, okopcone sreberka z folii aluminiowej, torebki z białą-beżową lub różową substancją przypominającą cukier, małe foliowe torebeczki
ecstasy	białe lub kolorowe pastylki z wytłoczonymi wzorkami, pęknięte naczynka krwionośne, a zwłaszcza na twarzy po powrocie z nocnych dyskotek
kokaina, crack	biały proszek w przypadku cracku, brązowe kuleczki, kamyki, fiolki i flakoniki, fajki, igły, strzykawki, małe foliowe torebeczki
amfetamina	biały proszek, tabletki, kapsułki, kryształki, małe foliowe torebeczki, igły i strzykawki
ropuszczalniki	torby foliowe, tuby kleju, smary, zapach chemikaliów we włosach i ubraniu, charakterystyczny zapach z ust utrzymujący się nawet kilka dni po zażyciu, nasączone chusteczki i szmatki
halucynogeny, LSD, grzybki	malutkie kartoniki z kolorowymi nadrukami, kolorowe „kamyki do zapalniczek”, różnego rodzaju suszone grzybki o zabarwieniu żółtawym do czarnego z prześwitem brązowym

Sygnaly mogące świadczyć o tym, że dziecko może mieć kontakty ze środowiskiem narkotycznym:

1. Nagłe zmiany nastroju (duża aktywność, zmęczenie), izolowanie i zamykanie się w sobie;
2. Nagła zmiana grona dotychczasowych przyjaciół na innych, zwłaszcza starszych od siebie;
3. Spadek zainteresowania szkołą, sportem i ulubionymi zajęciami; izolowanie się od innych domowników, spędzanie większości czasu samotnie w swoim pokoju.